

# CASO DO MÊS



Dra. Catarina Shaletich

Ribeirão Preto – SP

## ➤ **DADOS CLÍNICOS**





*Paciente feminina, 14 anos de idade.*





*"Lesão vegetante cervical há 1 ano. Nevus?"*




















➤ Considerando:




➤ - *neoplasia fusocelular*

➤ - *vasos numerosos*


➤ - *idade da paciente*




➤ >>>>>>> *avaliação imuno-histoquímica*




• vim




• S-100




- Melan A




• HMB 45



- CD34



- CD31



- Ki 67

Qual é o seu diagnóstico?



>>>>>>>>> **lesão melanocítica**

**NEVO DE SPITZ ANGIOMATÓIDE X MELANOMA**

- *simetria aparente da lesão*
- *padrão celular monótono*
- *ausência de mitoses na profundidade da lesão*
- *ausência de proliferação melanocítica atípica na epiderme*
- *IHQ*
- *idade da paciente*

**DIAGNÓSTICO:**

**NEVO DE SPITZ ANGIOMATÓIDE**

➤ ***NEVO DE SPITZ (NS)***



➤ - *Sophie Spitz (1948) : "melanoma juvenil benigno"*



➤ - *variantes:*

➤ . *halo nevo de Spitz*

➤ . *NS tubular*

➤ . *NS plexiforme*

➤ . *NS mixóide*

➤ . *NS polipóide*

➤ . *NS desmoplásico*

➤ . *NS angiomatóide*

## ➤ **NEVO DE SPITZ ANGIOMATÓIDE**



➤ - *Diaz-Cascajo C. et al. (Am.J.Dermatopathol. 2000;22:135):  
"Angiomatoid Spitz nevus: a distinct variant of desmoplastic Spitz  
nevus with prominent vasculature"*



➤ - *12 casos descritos (6 em abril/2009, J.Cutan.Pathology)*



➤ - *10 a 36 anos*



➤ - *pápula solitária em extremidade de mulher jovem*



- *11 sexo feminino:1 sexo masculino*



- *extremidades (caso sexo masculino: pescoço)*



➤ - *estroma fibro-vascular proeminente*



➤ - *nosso caso: sexo feminino, 14 anos, pescoço*



➤ - *diagnóstico diferencial: tumores vasculares e melanoma em regressão*

## ➤ **NS ANGIOMATÓIDE**



### ➤ **HISTOLOGIA:**



- - *lesão simétrica, bem delimitada*
- - *nevo composto ou intradérmico (6:6)*
- - *quantidade de melanócitos variável: escassos a numerosos (derme)*
- - *melanócitos epitelióides (++) ou fusiformes*
- - *pequenos ninhos ou melanócitos isolados*
- - *melanina escassa*
- - *mitoses muito raras (1, juncional)*
- - *outros aspectos de NS: corpos de Kamino (1), fendas periféricas nos ninhos juncionais*

## ➤ **NS ANGIOMATÓIDE**



### ➤ **HISTOLOGIA:**



- - *edema leve a moderado, superficial, na derme*
- - *fibrose dérmica intersticial*
- - *vascularização proeminente, uniformemente esparsa na lesão*
- - *fibrose limitada à extensão da lesão*
- - *endotélio vascular frequentemente proeminente*
- - *infiltrado linfocitário peri-vascular variável*
- - *IHQ: positividade difusa - S100; positividade focal e superficial - HMB45*



## ➤ **NS ANGIOMATÓIDE**



### ➤ **BIBLIOGRAFIA:**



- 1. *"Angiomatoid Spitz nevus: a distinct variant of desmoplastic Spitz nevus with proeminent vasculature"*.

- *Diaz-Cascajo C. et al.*

- *Am.J.Dermatopathol. 2000;22:135*



- 2. *"Angiomatoid Spitz naevus: a close simulator of regressing malignant melanoma"*.

- *Fabrizi G. et al.*

- *Br.J.Dermatol. 2001;145:845*



- 3. *"Angiomatoid Spitz nevus: a clinicopathological study of 6 cases and a review of the literature"*.

- *Tetzlaff MT, Elder DE et al.*

- *J.Cutan.Pathol. 2009;36:471-476*

# CASO DO MÊS



*Agradecemos sua participação*