

ORIENTAÇÕES AOS MÉDICOS PATOLOGISTA FRENTE AO CORONAVÍRUS

Diante do cenário de disseminação do novo coronavírus e do aumento exponencial dos casos positivos para Covid-19 no Brasil, a Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), com a missão de representar seus associados e oferecer-lhes suporte técnico-científico e profissional, traz orientações para adoção de medidas preventivas para serem adotadas durante este momento de pandemia.

Como reflexo da diminuição da realização de cirurgias eletivas, biópsias e outros procedimentos, está havendo uma progressiva redução do número de casos de rotina nos laboratórios de Anatomia Patológica instalados dentro e fora dos hospitais. Recomendamos que as equipes sejam reduzidas, atingindo uma composição que seja suficiente para cumprir, com nível de excelência, a demanda atual.

A Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) recomenda as seguintes medidas de segurança:

- **Adotar escalas que propiciem o rodízio dos profissionais em cada setor, evitando aglomeração. Privilegiar o trabalho essencial, adiando atividades extras como reuniões administrativas ou didáticas.**
- **Afastar temporariamente pessoal administrativo pertencente aos grupos de risco (>60 anos, portadores de doenças crônicas, cardio-pulmonar, oncológicas ou imunodeprimidos), sem penalidade na sua remuneração**
- **Suspender reuniões acadêmicas ou realizá-las on-line**
- **Realizar a constante limpeza de instrumentos e locais de trabalho**
- **Os profissionais que atuam em atividades administrativas e que têm contato direto com o público devem usar máscara e manter uma distância física de dois metros.**
- **Reduzir o contato social.**
- **Havendo manifestação de quadro clínico suspeito como tosse, coriza, febre e dispneia é recomendado o afastamento e se possível a coleta do exame de identificação do vírus no dia 3, onde é mais provável o seu reconhecimento. Na indisponibilidade de realização do teste, o profissional deve permanecer afastado pelo período mínimo de 10 dias após o início dos sintomas.**
- **Aos médicos patologistas que executam procedimentos como punção aspirativa, recomenda-se o reagendamento dos mesmos. No impedimento dessa conduta, o**

patologista deve usar máscara cirúrgica de padrão de proteção respiratória, que deve ser trocada a cada 2 horas ou ao término de cada atendimento, lavar a mão com água e sabão ou esfregar as mãos com álcool gel antes e depois de cada procedimento.

Para a população em geral, a Sociedade Brasileira de Patologia, alinhada ao que orienta a Organização Mundial de Saúde, recomenda que sejam mantidas as medidas de prevenção de disseminação do vírus, com atenção especial para os idosos, gestantes e pacientes portadores de doenças crônicas.

A Sociedade Brasileira de Patologia é uma entidade médica, de caráter científico, que manterá seus associados atualizados sobre as principais questões relacionadas com a epidemia de coronavírus e mantém os seus canais abertos para dirimir as possíveis dúvidas

São Paulo, 18 de março de 2020

Kátia Ramos Moreira Leite
Presidente da Sociedade Brasileira de Patologia